

UN ANDROPOGON NOUVEAU DE L'ASIE ORIENTALE,

PAR M^{LE} AIMÉE CAMUS.*Andropogon Thorelii A. Camus, nov. sp. (Arthrolophis).*

Perennis. Culmi 30-40 cm. alti, graciles, pauciodes, infra nodos pubescentes. Luminae siccaudo complicate, glabrae vel basi fimbriatae, inferiores 4-6 cm. longae, 1,5-2 mm. latæ, culmæ (1-2) 1-2 cm. longæ, costu media subtus parum prominula, nervis lateralibus tenuibus subobsoletis. Vaginæ glabrae, striatae, superiores elongatae. Ligula brevis, ciliata. Spathæ propriæ angustatae, 7-10 cm. longæ, laniuæ rudimento munitæ, demum a racemis longe remotæ. Pedunculus communis elongatus, longe exsertus. Racemorum alter pedunculo speciali 4 mm., alter 6 mm. longo. Racemi bini, 3-3,5 cm. longi, graciles, sericeo-villosi, albi, a spatha propria longe remoti, rhachi fragilissima, articuli pedicellique dense villosi, villis albis copiosis; articuli spiculæ sessili breviores, linearifiliformes, sursum subiucrassati, apice subdistincte cupulati. Spiculæ sessiles lanceolatae, 5 mm. longæ: gluma I^{ma} lanceolata, subacuta, glabra, dorso planiuscula, 5-nerris, marginibus angustissime inflexa, carinis ciliatis, callo brevissimo pilis gluma dimidia brevioribus barbato; II^{da} I^{me} æquans, oblongo-lanceolata, acuta, carinata, glabra; III^a primæ parum brevior, hyalina, lanceolata, acuta, glabra; IV^a quam II^{da} 2/3 brevior, angustata, glabra; arista glabra, elongata, 12 mm. longa, columnæ quam subula breviore. Spiculæ pedicellatae 2,5-3 mm. longæ, muticæ, tabescentes.

Laos : Kemarath (Thorel).

Proche de l'*Andropogon quinhonensis* A. Camus, l'*A. Thorelii* s'en distingue surtout par : ses chaumes poilus sous les nœuds, ses spathes propres à limbe presque nul, réduites à la gaine très longue et étroite, les articles du rachis à appendice rudimentaire, les épilletts à glume inférieure subaiguë et non brusquement atténuée, bi-mucronulée au sommet, à dos presque plan et 5-nervée, enfin par la glumelle inférieure de la fleur supérieure entière.

L'*A. Thorelii* présente aussi beaucoup de caractères communs avec l'espèce américaine *A. argyræus* Schult., mais s'en différencie par : ses péduncules spéciaux plus longs, la pubescence plus courte du rachis et des pédicelles, la glume inférieure presque plane entre les carènes, 5-nervée, la glumelle inférieure de la fleur supérieure entière et non lobée.